

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ ГЕМОРРОЯ

- Соблюдение диеты и режима питания.
- Марлевые повязки с мазями: «Левомиколь», «Гидрокортизон», «Катеджель» на область ануса по 1мл каждой мази. Размешивать мази на салфетке не требуется. Одна салфетка может находится в области ануса до 6 часов. Затем салфетку необходимо поменять на новую. Салфетки с мазями на анусе должны находится в течение всего времени заживления (до 2-х недель).

Наличие на салфетке сукровичных, небольших кровяных и других выделений является нормальным течением послеоперационного периода. Подобные выделения возможны в течение 2 недель после операции.

- «Детралекс» по 500 мг: в первую неделю по 2 таб. 3 раза в день, затем еще 1 неделю по 1 таб. 3 раза в день.
- В качестве обезболивающей терапии рекомендуются препараты «Кетонал Ретард» по 150 мг и «Баралгин» по 500 мг в таблетированной форме. Оба препарата принимаются внутрь одновременно и запиваются стаканом воды.
- Слабительное «Дюфалак» по 20 мл. Первоначально назначается средняя дозировка, затем дозировка либо снижается на 5 мл в день при частом и жидком стуле, либо увеличивается на 5 мл в день при плотном стуле. При нормальном стуле дозировка не меняется.
- Ванночки с марганцовокислым калием или отваром ромашки. Температура воды 30–31°С, время – 10 минут.
- Дополнительное назначения: «Дицинон» 250 мг: по 1 таб. 2 раза в день, 7 дней.